



# XVII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

O Pediatra conduzindo a Saúde do Futuro

15 a 17 de maio de 2025

CENTRO DE CONVENÇÕES BARRA SHOPPING  
PORTO ALEGRE - RS

## Relato de Caso - Icterícia Neonatal por Incompatibilidade ABO

TAMARA MARIELLE DE CASTRO - tamara\_mdcastro@hotmail.com (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS);

CAROLINA STEDILE SIXTO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS); DÉBORA DRAEGER KUNDE (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS); RAQUEL ROCHA LIMA MOTA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS); FERNANDA LOTUFO ORENGO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS); BARBARA CATINI FONSECA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS); JÚLIA MERLADETE FRAGA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS); CLÁUDIO SAGRILO JÚNIOR (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS)

### INTRODUÇÃO

A icterícia neonatal é uma condição comum nos primeiros dias de vida, podendo ter etiologia fisiológica ou patológica. A incompatibilidade ABO é uma das principais causas de icterícia hemolítica em recém-nascidos.

### DISCUSSÃO

A incompatibilidade ABO é responsável por até 20% dos casos de icterícia patológica em neonatos. O quadro clínico costuma se manifestar precocemente, com icterícia intensa e hemólise leve a moderada. A detecção precoce, aliada ao uso adequado da fototerapia, é essencial para prevenir complicações como kernicterus. O teste de Coombs direto positivo em RN de mãe grupo O e filho grupo A ou B é um marcador importante de hemólise imune.

### RELATO DE CASO

Recém-nascida a termo, sexo feminino, com 2800g ao nascimento, filha de mãe O RhD positivo. O tipo sanguíneo da RN foi A RhD positivo, com teste de Coombs direto fortemente positivo (3+), configurando incompatibilidade ABO. A RN apresentou icterícia nas primeiras horas de vida, sendo iniciado tratamento com fototerapia dupla, mantido por dois dias, seguido de fototerapia simples por mais alguns dias. Evoluiu com melhora progressiva dos níveis de bilirrubina, sem necessidade de outras intervenções, e sem reaparecimento de icterícia após suspensão do tratamento.

### CONCLUSÃO

O caso destaca uma apresentação típica de icterícia por incompatibilidade ABO, com início precoce, teste de Coombs positivo e boa resposta à fototerapia. A conduta adequada permitiu reversão do quadro sem intercorrências ou necessidade de tratamento invasivo.

### PALAVRAS-CHAVE

Icterícia neonatal; incompatibilidade ABO;

### REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção à Icterícia Neonatal. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
2. MARTINS, B.M. et al. Icterícia neonatal: uma revisão clínica. Revista Paulista de Pediatria, v. 36, n. 2, p. 186-194, 2018.
3. MORAES, F. et al. Incompatibilidade ABO materno-fetal e icterícia neonatal: aspectos clínicos e laboratoriais. Jornal de Pediatria (Rio J.), v. 79, n. 2, p. 109-114, 2003.